

Este documento, tiene una finalidad meramente informativa. El día de la realización del tratamiento, se le hará entrega del mismo formulario, pero personalizado con sus datos y los datos del doctor que le intervendrá, y sí tendrá validez como consentimiento al realizar la intervención ahora descrita. El objetivo de esta entrega previa, es que lo pueda leer detenidamente y si le surge cualquier tipo de duda, nos los pueda hacer saber con anterioridad a la intervención.



TEXTO DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE FASE BÁSICA PERIODONTAL QUE USTED TENDRÁ QUE FIRMAR ANTES DE SU INTERVENCIÓN

FINALIDAD DE LA FASE BÁSICA

- Aliviar o detener la evolución de la **enfermedad periodontal**.

OBJETIVOS DE LA FASE BÁSICA

- Eliminar los contaminantes adheridos a la superficie de las raíces dentarias: el cálculo, la placa bacteriana o biofilm y la capa más superficial, contaminada, del cemento (un tejido dentario que envuelve a las raíces).
- Alisar las superficies de dichas raíces para facilitar la adhesión de la encía al diente.
- Reducir las bolsas periodontales a una profundidad fisiológica o normal para que Vd. pueda mantener libre de microbios el **surco crevicular** («rendija» entre la encía y el diente) mediante una correcta técnica de cepillado. Si no se logra, estará indicada la repetición de la fase básica o el tratamiento quirúrgico.

NATURALEZA DEL TRATAMIENTO «FASE BÁSICA» Y LIMITACIONES DEL MISMO

- Generalmente previa anestesia, se raspan meticulosamente las superficies de las raíces de los dientes por debajo de la encía mediante unos instrumentos de mano adecuados (curetas).
- El raspado-alisado radicular no garantiza la remisión o reducción suficiente de las bolsas, por lo que puede ser necesaria su repetición o el recurso a procedimientos quirúrgicos.
- La regeneración de los tejidos dañados o perdidos anteriormente es excepcional y en todo caso muy limitada (nunca completa).
- **Importante:** Le recordamos que **el tratamiento de la enfermedad periodontal no es curativo definitivamente**, por lo que Vd. necesitará un **tratamiento de mantenimiento** crónico a base de:
 1. **Profilaxis** (limpiezas) periódicas en la consulta (habitualmente cada dos a seis meses, aunque variará según su riesgo personal de experimentar una recidiva o reactivación, lo que depende fundamentalmente de su técnica de cepillado y de si Vd. fuma)
 2. Ocasionales **repeticiones** del tratamiento, mediante **fases básicas** (raspado-alisado radicular) y, más raramente, cirugía.



CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES

- Si tiene, o cree tener, **alergia al látex** debe advertirnoslo porque la mayoría de los guantes lo contienen.
- Si ha tenido, o cree tener, **alergia o algún tipo de intolerancia o reacción anormal a los anestésicos locales o a los vasoconstrictores**, debe hacérsenoslo saber inmediatamente.
- Si tiene **hipertensión o diabetes**, no se olvide de indicárnoslo, ya que determinados componentes de los anestésicos locales (vasoconstrictores) pueden exacerbarla.
- Si tienen **problemas de coagulación o está tomando anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, aspirina o antiinflamatorios**, debe advertirnoslo para adoptar las precauciones y medidas específicas.
- Adviértanos si tiene Vd. alguna enfermedad cardíaca que aconseje hacer **profilaxis frente a la endocarditis bacteriana** (fiebre reumática, válvulas cardíacas artificiales, etc.).
- Si es Vd. portador de **marcapasos cardíaco**, adviértanoslo, porque está contraindicado el uso los aparatos de ultrasonidos utilizados en las profilaxis.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA QUE EL TRATAMIENTO ORIGINA CON SEGURIDAD

- **Reducción de la altura de las encías**, por desinflamación y cicatrización de las mismas, que, especialmente si se realizó alguna resección con las curetas, comporta un cierto alargamiento de los dientes (en realidad, de las coronas clínicas, que es la parte visible de los dientes). Según la zona y la anatomía y movilidad de sus labios puede tener una cierta repercusión **inestética** (aunque sea más saludable que el mantenimiento de la enfermedad).
- Con la repetición de raspados puede producirse un **adelgazamiento paulatino** de las zonas tratadas de las raíces.

RIESGOS PROBABLES EN CONDICIONES NORMALES

- En primer lugar, recordaremos los derivados de la anestesia local, ya comentados.
- Es muy frecuente la aparición (o empeoramiento temporal, si ya existía) de **hiperestesia** (sensibilidad excesiva, a veces dolorosa, que suele llamarse erróneamente «hipersensibilidad», aunque la verdadera hipersensibilidad es un tipo de alergia) con el frío, y ocasionalmente con ácidos y azúcares (p.ej., zumos de frutas). La recuperación (a veces, de manera incompleta) puede tardar varios meses).
- Como en todos los tratamientos mecánicos en la boca se pueden producir **pequeños daños en los tejidos blandos adyacentes e inflamación en la zona**, que a su vez puede aumentar la sensación o la amplitud de la movilidad de sus dientes. Todo ello suele curar o mejorar en unos pocos días.
- También se pueden producir pequeñas **hemorragias localizadas**, que suelen ceder en unas horas.
- Puede **notar molestias al cepillarse** en la zona tratada, durante dos o tres días.

Consúltenos si tiene cualquier duda:

93 731 78 20

 608 297 949

Puede descargarse esta información en:

<http://www.dentalcanparellada.es/pdf/consentimiento/basica-periodontal-cas.pdf>