


Aquest document, té una finalitat merament informativa. El dia de la realització del tractament, se li lliurà el mateix formulari, però personalitzat amb les seves dades i les dades del doctor que li intervindrà, i si tindrà validesa com a consentiment al realitzar la intervenció ara descrita. L'objectiu d'aquest lliurament previ, és que ho pugui llegir detingudament i si té qualsevol tipus de dubte, ens el pugui fer saber amb anterioritat a la intervenció.



TEXT DEL CONSENTIMENT INFORMAT SOBRE IMPLANTS ZIGOMÀTICS

INFORMACIÓ SOBRE ELS IMPLANTS ZIGOMÀTICS

DESCRIPCIÓ

Els implants zigomàtics són implants dentals modificats, de **major mida** als habituals, que es fixen a l'**os malar** en situacions de disponibilitat insuficient per a la utilització d'implants convencionals. Si bé es poden simular en planificació guiada, la seva col·locació suposa la necessitat d'incisió, desenganxament de teixits tous, preparació del trajecte ossi i sutura. En determinades situacions cal la manipulació quirúrgica del si maxil·lar.

Solen efectuar-se sota anestèsia general o sedació intravenosa. Aquests implants estan indicats en situacions de dèficit d'os alveolar residual per motius atrofics, tumorals, traumàtics, malformatius, fracàs d'altres tractaments o altres circumstàncies menys habituals. La seva alternativa són els implants convencionals amb reconstrucció i/o regeneració i, en determinats casos, els implants curts i basals, procediments amb avantatges i inconvenients dels quals ha estat informat/da abans de començar el tractament.

L'**èxit** dels implants zigomàtics és molt alt, superior al 90-98% en la majoria dels casos, i millora en rehabilitacions maxil·lars totals amb l'ús de pròtesis de funció immediata. El seu ús en rehabilitacions parcials és clínicament exitós però no forma part del protocol consensuat d'actuació, i cal convenir-ne amb el pacient l'ús i altres alternatives.

RISCOS

El/la pacient ha estat informat/da i coneix els **riscos estadísticament freqüents** que pot comportar aquest tractament:

- Riscos propis de la injecció d'anestèsia local: possibles hipersensibilitats a l'anestèsic difícilment previsible, anestèsies perllongades, danys locals per punció, etc.
- Risc d'inflamació i dolor a la zona tractada a causa del procediment quirúrgic.
- Risc d'hemorràgia i aparició d'hematomes a la zona o àrees adjacents.
- Risc de dehiscència (separació) de les sutures emprades.
- Risc que es produeixin petits danys a les zones properes a les tractades a causa de la manipulació i separació de teixits propis de la cirurgia, especialment esquinçaments de la mucosa sinusal i trencament de la cortical òssia (que obligaria a utilitzar altres procediments de tancament del si maxil·lar).

- Risc de sobreinfecció de les ferides quirúrgiques pels gèrmens bucal.
- Risc de pèrdua de sensibilitat, temporal o no, a la zona tractada pels danys produïts a les petites terminacions nervioses.
- Risc de danyar les arrels dentàries adjacents.
- Risc de fracàs en la integració òssia dels implants. De vegades, per causes desconegudes, l'os no integra l'implant i s'acaba perdent. Això implica la necessitat de repetir la fase quirúrgica i, de vegades, de replantejar el tractament.
- Risc de fracàs de l'implant a més llarg termini. El fet que l'implant s'hagués integrat a l'os en un primer moment no implica que no pogués fracassar posteriorment. Les causes són múltiples i moltes, desconegudes: factors relacionats amb l'oclusió, amb la higiene defectuosa, amb la manca de revisions periòdiques, factors intrínsecs a la pròpia biologia del pacient, etc. Depenent del cas concret, es podria recol·locar l'implant en una zona propera o s'hauria de replantejar tota la rehabilitació, fins i tot descartant l'ús d'implants. El fracàs d'algun implant suposa la modificació, o la majoria de vegades, haver de canviar completament la pròtesi recolzada sobre ells.
- Risc d'ingestió o aspiració del material quirúrgic petit o de pròtesi emprat.
- Risc de fractura del material implantat o dels additaments protètics emprats a causa de la magnitud de les forces oclusals suportades.
- Risc de problemes relacionats amb la pròtesi i que es detallen en un document a part.
- Els implants zigomàtics incorporen riscos propis d'infecció local i possibles fístules cutànies cròniques (que poden requerir accessos transcutanis per al tractament), disestèsies anestèsiques infraorbitàries i de la zona malar i dany d'estructures veïnes (molt rarament s'han descrit complicacions per invasió orbitària). En cas de sinusitis de repetició en pacients portadors d'implants zigomàtics pot ser necessària la intervenció oral. Poden aparèixer comunicacions entre la boca i el nas o els sins maxil·lars.

Si cal retirar un implant zigomàtic de forma total o parcial per fracàs, no sempre és possible el seu reemplaçament i poden estar indicats altres procediments alternatius o modificar l'estratègia de rehabilitació del tot.

Eventualment es pot avortar el procediment per problemes relacionats amb l'anestèsia general o sedació o per problemes en la inserció de l'implant, sent aquesta circumstància excepcional.

El fracàs del tractament a curt, mitjà o llarg termini o l'aparició de complicacions amb necessitat d'intervenció del professional que l'atén o d'altres especialistes mèdics o quirúrgics pot comportar despeses econòmiques addicionals no contemplades en el pressupost inicial que prèviament ha acceptat.

En qualsevol cas, no és possible garantir mèdicament l'èxit inicial, final o a mitjà o llarg termini del tractament implantològic.

- Tot i l'èxit del tractament inicial, no es realitza el procediment amb garanties de per vida ni com a rehabilitació definitiva de per vida igual que en cap tractament implantològic.

PAUTES I SEGUIMENT

El pacient també ha estat informat que ha de seguir els consells i pautes de tractament donats pel professional i que haurà de consultar qualsevol eventualitat que ocorregués i que li sembli anormal.

A més, heu de seguir meticulosament les instruccions sobre higiene de l'implant i de la pròtesi i acudir a les revisions periòdiques acordades amb el professional, almenys cada sis mesos, i sempre que tingui qualsevol molèstia o dubte sobre el tractament.

Consulteu-nos si té qualsevol dubte:

93 731 78 20 | 608 297 949

Pot descarregar-se aquesta informació a:

<https://www.dentalcanparellada.es/pdf/consentimiento/implantes-zigomaticos-cat.pdf>