

SEDACIÓ CONSCIENT

EXPLICACIÓ

Mitjançant la sedació conscient el pacient entra en un estat de relaxació i somnolència, però sense perdre la facultat de respondre a les ordres de l'odontòleg, ja que NO és una anestèsia general.

La sedació s'aplica en tractaments de llarga durada d'una única sessió de diverses hores, ja que es redueix la sensació del temps transcorregut durant la cirurgia, eliminant les molèsties i el dolor.

També està indicada en persones amb por o fòbia als procediments dentals, en persones ansioses o per a tothom que vulgui un grau extra de confort. Normalment la por ve donada pel temor de patir dolor, amb la sedació conscient, s'eliminen les molèsties i el dolor. El record de la cita i del tractament deixen de ser traumàtics.



FASES DEL SERVEI

1. **Primera Fase:** És la fase preoperatoria. En aquesta fase els professionals valoren que el pacient és apte per rebre una sedació conscient: es valoren al·lèrgies, hàbits tòxics, medicació, possibles proves complementàries, ...
2. **Segona Fase:** A la intervenció, el metge anestesiològ administra per via endovenosa al pacient una combinació d'un o diversos medicaments que provoquen una lleu depressió del sistema nerviós central. La seva intensitat es pot modular si es requereix (de mínima a moderada) i les constants vitals són supervisades en tot moment pel metge anestesiològ. Es pot recolzar amb la inhalació de gasos medicinals mitjançant mascareta de relaxació.
3. **Tercera Fase:** Eliminació dels medicaments. La medicació administrada té una vida mitjana curta i els seus efectes desapareixen ràpidament. En finalitzar el tractament, normalment romandrà uns 30 minuts més a la clínica i el trasllat a casa s'ha de fer amb un acompanyant (no és aconsellable que conduïxi o realitzi activitats potencialment perilloses almenys 12 hores després de la sedació).

INDICACIONS PRINCIPALS



BOX DE CIRURGIA

