




INSTRUCCIONES DE MANEJO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRÓTESIS FIJAS: SOBRE IMPLANTES

DESCRIPCIÓN

Las prótesis dentales fijas son prótesis confeccionadas a medida que van atornilladas y/o cementadas a los implantes que están integrados en su hueso.

VENTAJAS Y LIMITACIONES

La prótesis fija es una de las prótesis más cómodas, mejor toleradas y que menos problemas produce. Proporciona una masticación casi natural, un habla y una estética muy adecuadas. Como no lleva un implante por diente, suele quedar un mínimo espacio entre la encía y la prótesis, igual que sucede con los dientes naturales, al hablar se puede escapar algo de saliva y de aire, produciendo un cierto «ceceo». Con el tiempo, el proceso de atrofia natural de los huesos maxilares puede hacer que se vean mayores esos espacios. No tiene que notar que se mueva, por lo que aconsejamos controles frecuentes con su dentista. No podrá retirarla de la boca para limpiarla, por lo que exige más cuidado por su parte en la higiene dental diaria para evitar el acumulo de sarro y placa dental.

Dado que la falta de dientes, “edentulismo”, es una secuela, este tratamiento no tiene finalidades curativas o terapéuticas, pues únicamente está destinado a sustituir los dientes perdidos.



INSTRUCCIONES

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las **siguientes Instrucciones de Manejo, Cuidado y Mantenimiento**, que le facilitarán el empleo de las prótesis e incrementarán su duración en condiciones apropiadas.

Adaptación

Al principio:

- Puede tener la impresión de que los dientes artificiales son demasiado grandes, ante la diferencia con antes que no se tenían; pero desaparece al cabo de unos días.
- Es probable que se muerda fácilmente en las mejillas y la lengua, por su tendencia a introducirse en los espacios donde faltaban dientes, pero en poco tiempo aprenderá a evitarlo comiendo despacio.
- Le aumentará la producción de saliva, aunque se irá normalizando poco a poco.
- Inicialmente experimentará una disminución del sentido del gusto, o alteraciones en los sabores o ardores en boca o lengua, se recuperará al cabo de unas semanas.
- El habla o la pronunciación de algunos sonidos puede resultar un poco alterada. Por ello, probablemente necesitará un tiempo y entrenamiento para aprender a vocalizar ciertas palabras; habitualmente se consigue este aprendizaje en unas pocas semanas.
- Si notara alguna movilidad o ligeras molestias en los dientes, deberá acudir a la clínica de seguida, donde se le ajustará.

Recomendaciones

- Los primeros días, procure cerrar la boca y masticar con cuidado, para no morderse.
- Para tratar las heridas de las mordeduras, puede utilizar colutorios, pomadas o geles calmantes y cicatrizantes, sobre los que su dentista le aconsejará.
- Preste atención al empaquetamiento o retención de alimentos entre las prótesis y las encías.

Colocación y desinserción

Estas prótesis van atornilladas a los implantes, por lo que usted no podrá quitarlas, ni ponerlas. Si se mueven es que se han desatornillado, o bien que sus implantes están afectados, por lo que requiere que acuda a la clínica para una valoración y si es viable, volver a apretarlos.

Cuidados e higiene

- Sea muy cuidadoso con la prótesis fija: evite partir alimentos muy duros, como frutos secos con cáscara, corazas de mariscos, etc, para evitar fracturas del material que recubre la prótesis (que no debería tampoco morderse con los dientes naturales).
- Debe mantener una higiene correcta, que incluya su cepillado habitual de la lengua, encías y de la prótesis, debe hacerse inmediatamente después de cada comida, y especialmente antes de acostarse, porque durante el sueño se produce menos saliva, con lo que disminuye el efecto protector de esta frente a la enfermedad periodontal y salud de sus mucosas.
- La limpieza la hará: en las partes accesibles, con cepillo dental y pasta dentífrica; entre la prótesis y la encía (donde se puede acumular placa y algún resto de comida blanda que, al fermentar, pueden producir halitosis –mal aliento), puede usar una seda especial, provista de un extremo endurecido, y en las troneras (espacios entre encías y dientes) o cepillos interdetales, deslizándolos hacia adentro y afuera. Al final puede utilizar un irrigador bucal, con o sin colutorio.

ATENCIÓN FUMADORES:

Se ha comprobado que las personas que fuman de manera regular tienen MAYOR riesgo de complicaciones y/o fracaso de sus implantes. El fumar hace que disminuya el riego sanguíneo y como consecuencia dificulta la formación de hueso alrededor del implante. El tabaco disminuye también sus defensas contra las bacterias.



Revisiones e incidencias

Una vez colocadas las prótesis fijas definitivas, es aconsejable seguir acudiendo al dentista periódicamente para comprobar y poder corregir a tiempo la aparición de inflamación de encías, periimplantitis, movilidad de la prótesis, posibles ulceraciones, etc.

Ante cualquier molestia llámenos o acuda a la clínica.

Consúltenos si tiene cualquier duda:

☎ 93 731 78 20 | 📍 608 297 949

Puede descargarse esta información en:

<https://www.dentalcanparellada.es/pdf/posteriores/protesis-fijas-sobre-implantes-cas.pdf>