



INSTRUCCIONES DE MANEJO, CUIDADO Y MANTENIMIENTO

PRÓTESIS HÍBRIDAS / POSTINMEDIATAS FIJAS

DESCRIPCIÓN

La prótesis dental provisional fija son prótesis que van atornilladas a los implantes que están recién colocados en su hueso. Este tipo de prótesis es un provisional, su función principal es estética, el material con que está confeccionada no es tan resistente, por lo que tendrá que tener algunos cuidados a la hora de comer.

LIMITACIONES

La prótesis podría no estar bien adaptada ya que la medida ha sido tomada previamente a la cirugía. Notará que su encía en las próximas semanas a la cirugía empezará a retraerse debido a la cicatrización, sobre todo si le han realizado extracciones dentales el mismo día de la colocación de los implantes.

Como no lleva un implante por diente, suele quedar un mínimo espacio entre la encía y la prótesis, al hablar se puede escapar algo de saliva y de aire, produciendo un cierto «ceceo». Con el paso de los días podría notar mayores espacios. No tiene que notar que se mueva, por lo que aconsejamos acudir en caso de que lo notara. No podrá retirarla de la boca para limpiarla, por lo que exige más cuidado por su parte en la higiene dental diaria para evitar el acumulo de sarro y placa dental.



INSTRUCCIONES

Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir detenidamente las **siguientes Instrucciones de Manejo, Cuidado y Mantenimiento**, que le facilitarán el empleo de las prótesis e incrementarán su duración en condiciones apropiadas.

Adaptación

Al principio:

- Puede tener la impresión de que los dientes artificiales son demasiado grandes, ante la diferencia con antes que no se tenían.
- Es probable que se muerda fácilmente en las mejillas y la lengua, por su tendencia a introducirse en los espacios donde faltaban dientes, pero en poco tiempo aprenderá a evitarlo comiendo despacio.
- Le aumentará la producción de saliva, aunque se irá normalizando poco a poco.
- Inicialmente experimentará una disminución del sentido del gusto, o alteraciones en los sabores o ardores en boca o lengua, se recuperará al cabo de unas semanas.
- El habla o la pronunciación de algunos sonidos puede resultar un poco alterada. Por ello, probablemente necesitará un tiempo y entrenamiento para aprender a vocalizar ciertas palabras; habitualmente se consigue este aprendizaje en unas pocas semanas y también al cambiar a la prótesis definitiva, que se realizará más a medida.
- Si notara alguna movilidad o ligeras molestias en los dientes, deberá acudir a la clínica de seguida, donde se le ajustará.

Recomendaciones

- Los primeros días, procure cerrar la boca y masticar con cuidado, para no morderse.
- Para tratar las heridas de las mordeduras, puede utilizar colutorios, pomadas o geles calmantes y cicatrizantes, sobre los que su dentista le aconsejará.
- Preste atención a la al empaquetamiento o retención de alimentos entre las prótesis y las encías.

Colocación y desinserción

Estas prótesis van atornilladas a los implantes, por lo que usted no podrá quitarlas, ni ponerlas. Si se mueven es que se han desatornillado, o bien que sus los implantes están afectados, por lo que requiere que acuda a la clínica para una valoración y si es viable volver a apretarlos.

Cuidados e higiene

- Sea muy cuidadoso con la prótesis: deberá comer alimentos suaves o blandos, evite partir alimentos muy duros, como frutos secos con cáscara, corazas de mariscos, etc, para evitar fracturas del material.
- Debe mantener una higiene correcta, que incluya su cepillado habitual de la lengua, encías y de la prótesis, debe hacerse inmediatamente después de cada comida, y especialmente antes de acostarse, porque durante el sueño se produce menos saliva, con lo que disminuye el efecto protector de esta frente a la enfermedad periodontal y salud de sus mucosas.
- La limpieza la hará: en las partes accesibles, con cepillo dental y pasta dentífrica; entre la prótesis y la encía (donde se puede acumular placa y algún resto de comida blanda que, al fermentar, pueden producir halitosis –mal aliento), puede usar una seda especial, provista de un extremo endurecido, y en las troneras (espacios entre encías y dientes) cepillos interdetales, deslizándolos hacia adentro y afuera. Al final puede utilizar un irrigador bucal, con o sin colutorio.

ATENCIÓN FUMADORES:

Se ha comprobado que las personas que fuman de manera regular tienen MAYOR riesgo de complicaciones y/o fracaso (pérdida) de sus implantes. El fumar hace que disminuya el riego sanguíneo y como consecuencia dificulta la formación de hueso alrededor del implante. El tabaco disminuye también sus defensas contra las bacterias, pudiendo causar infecciones posteriores y retardando la cicatrización.



Revisiones e incidencias

Ante la más mínima molestia, movilidad o anomalía en la prótesis debe llamarnos y acudir a la clínica. Si surge algún problema, no intente resolverlo Vd. mismo. Las encías con el tiempo sufren modificaciones y con ello se producen desajustes en las prótesis que deberán ser corregidas si fuera necesario.

Consúltenos si tiene cualquier duda:

☎ 93 731 78 20 | 📍 608 297 949

Puede descargarse esta información en:

<https://www.dentalcanparellada.es/pdf/posteriores/protesis-hibridas-postinmediatas-cas.pdf>