



INSTRUCCIONS DE MANEIG, CURA I MANTENIMENT

PRÒTESIS HÍBRIDES / POSTIMMEDIATES FIXES

DESCRIPCIÓ

La pròtesi dental provisional fixa són pròtesis que van cargolades als implants que estan acabats de col·locar en el seu os. Aquest tipus de pròtesi és un provisional, la seva funció principal és estètica, el material amb què està confeccionada no és tan resistent, de manera que haurà de tenir algunes cures a l'hora de menjar.

LIMITACIONS

La pròtesi podria no estar ben adaptada ja que la mida ha estat presa prèviament a la cirurgia. Notarà que la seva geniva en les pròximes setmanes a la cirurgia començarà a retreure's a causa de la cicatrització, sobretot si li han realitzat extraccions dentals el mateix dia de la col·locació dels implants.

Com no porta un implant per dent, acostuma a quedar un mínim espai entre la geniva i la pròtesi, al parlar es pot escapar una mica de saliva i d'aire, produint un cert «ceceo». Amb el pas dels dies podria notar majors espais. No ha de notar que es mogui, per la qual cosa aconsellem acudir en cas que ho notés. No podrà retirar-la de la boca per netejar-la, pel que exigeix més cura per la seva part en la higiene dental diària per evitar l'acumulació de tosca i placa dental.



INSTRUCCIONS

Per aconseguir un bon funcionament, ha de seguir detingudament les següents **Instruccions de Maneig, Cura i Manteniment**, que li facilitaran l'ús de les pròtesis i incrementaran la durada en condicions apropiades.

Adaptació

Al principi:

- Pot tenir la impressió que les dents artificials són massa grans, davant la diferència amb abans, que no hi eren.
- És probable que es mossegui fàcilment les galtes i la llengua, per la tendència a introduir-se en els espais on faltaven dents, però en poc temps aprendrà a evitar-ho menjant a poc a poc.
- Li augmentarà la producció de saliva, tot i que s'anirà normalitzant poc a poc.
- Inicialment experimentarà una disminució del sentit del gust, o alteracions en els sabors o ardors en boca o llengua, es recuperarà al cap d'unes setmanes.
- La parla o la pronunciació d'alguns sons pot resultar una mica alterada. Per això, probablement necessitarà un temps i entrenament per aprendre a vocalitzar certes paraules; habitualment s'aconsegueix aquest aprenentatge en unes poques setmanes i també al canviar a la pròtesi definitiva, que es realitzarà més a mida.
- Si notés alguna mobilitat o lleugeres molèsties a les dents, haurà d'acudir a la clínica de seguida, on se li ajustarà.

Recomanacions

- Els primers dies, procuri tancar la boca i mastegar amb compte, per no mossegar-se.
- Per tractar les ferides de les mossegades, pot utilitzar col·lutoris, pomades o gels calmants i cicatritzants, sobre els quals el seu dentista li aconsellarà.
- Pareu atenció a l'empaquetament o retenció d'aliments entre les pròtesis i les genives.

Col·locació i desinserció

Aquestes pròtesis van cargolades als implants, pel que vostè no podrà treure-les, ni posar-les. Si es mouen és que s'han descargolat, o bé que els seus implants estan afectats, de manera que es requereix que acudeixi a la clínica per a una valoració i si és viable, tornar a rosar-los.

Cures i higiene

- Sigui molt acurat amb la pròtesi: haurà de menjar aliments suaus o tous, eviti partir aliments molt durs, com fruits secs amb closca, cuirasses de marisc, etc., per evitar fractures del material.
- Ha de mantenir una higiene correcta, que inclogui el raspallat habitual de la llengua, genives i de la pròtesi, s'ha de fer immediatament després de cada menjar, i especialment abans d'anar a dormir, perquè durant el son es produeix menys saliva, amb el que disminueix l'efecte protector d'aquesta davant la malaltia periodontal i la salut de les seves mucoses.
- La neteja la farà: a les parts accessibles, amb raspall dental i pasta dentífrica; entre la pròtesi i la geniva (on es pot acumular placa i alguna resta de menjar tou que, al fermentar, poden produir halitosi -mal alè), podeu utilitzar una seda especial, proveïda d'un extrem endurit, i en les troneres (espais entre genives i dents) raspalls interdentials, lliscant cap a dins i fora. Al final pot utilitzar un irrigador bucal, amb o sense col·lutori.

ATENCIÓ FUMADORS:

S'ha comprovat que les persones que fumen de manera regular tenen MAJOR risc de complicacions i/o fracàs (pèrdua) dels seus implants. El fumar fa que disminueixi el reg sanguini i com a conseqüència dificulta la formació d'os al voltant de l'implant. El tabac disminueix també les seves defenses contra els bacteris, podent causar infeccions posteriors i retardant la cicatrització.



Revisions i incidències

Davant la més mínima molèstia, mobilitat o anomalia en la pròtesi ha de trucar-nos i anar a la clínica. Si es produeixen problemes, no intenti resoldre'ls vostè mateix. Les genives amb el temps pateixen modificacions i amb això es produeixen desajustos en les pròtesis que hauran de ser corregits si fos necessari.

Consulteu-nos si té qualsevol dubte:

☎ 93 731 78 20 | 📍 608 297 949

Pot descarregar-se aquesta informació a:

<https://www.dentalcanparellada.es/pdf/posteriores/protesis-hibridas-postinmediatas-cat.pdf>